



NOVÝ CHOVNÝ PÁR KALIMIK!

Kalimika, neboli tamaríny skákavé, jak zní jejich starší název, chová olomoucká zoo od roku 1997. V uplynulém roce jsme se rozloučili se samcem i samicí. Oba se dožili v naší zoo vysokého věku, ale samice byla s délkou života 25 let rekordmankou. „K nedávno získané samičce ze Zoo Ljubljana jsme přivezli mladého samce ze švýcarské Walter zoo, čímž jsme získali mladý nadějný pár a k tomu i doporučení koordinátora k rozmnožování tohoto druhu v naší zoo. Jedná se o klidná a vyrovnaná zvířata, a i jejich spojování se povedlo po velmi krátkém seznámení,“ uvádí Ing. Jitka Vokurková. Za dobu chovu se v Zoo Olomouc narodila pouze 3 mláďata.

VÝJIMEČNÉ DRÁPKATÉ OPICE

Tento druh byl poprvé **popsán v roce 1904** a je **jediným zástupcem** rodu *Callimico*. Je o něco větší než ostatní drápkaté opice. Dokáže velmi dobře šplhat a skákat i **do vzdálenosti čtyř metrů**. Po průměrné době březosti 144-159 dnů samice obvykle **porodí jediné mládě**, a ne dvojčata jako u jiných kosmanů a tamarínů. Další zvláštností je, že v **prvních týdnech života** se o mládě **stará a nosí je především matka**. Otec a ostatní členové skupiny se výchovy účastní až později. Mláďata jsou kojena tři měsíce, v té době si již začínají samostatně shánět potravu. Dospívají ve druhém roce života. Na rozdíl od ostatních druhů čeledi *Callitrichidae* může samec pářit více samic v jedné skupině, avšak samice se stávají vůči sobě agresivní a bojují o dominantní postavení. Mají schopnost rodit dvakrát ročně. Půlroční porody se pravidelně vyskytují v chovech a méně již ve volné přírodě a jsou připisovány poporodní říji, která umožňuje samici zabřeznout velmi brzy. K těmto vícečetným porodům přispívá i dostupnost hub – jejich důležitého zdroje potravy.

OBECNÉ INFORMACE

Kalimika patří k tzv. **drápkatým opicím**, které mají přeměněné **nehty na dráčky**. V pralese se nejčastěji pohybují ve výšce do 5 metrů. Vyskytují se na severozápadě Jižní Ameriky, konkrétně obývají houštiny a přízemní patra pralesů Bolívie, Brazílie a Peru, kde za účelem vyhledávání potravy často sestupují i na zem. V přírodě jsou ohroženi ztrátou přirozeného prostředí v důsledku **kácení deštných lesů**. V jejich potravě je **v menší míře** zastoupeno **ovoce, květy i míza stromů a ve větší hmyz, pavouci, vejce a menší druhy obratlovců**. Houby tvoří **majoritní část jejich potravy**, i v období **sucha bývají v potravě zastoupeny až 40 %**. Jsou **jedinými tropickými primáty, o kterých je známo, že jsou na tomto zdroji potravy závislí**. Členové skupiny vydávají **syčení, trylky** a dlouhé **cvrlikání**, aby ukázali hrozbu nebo dominanci. Předpokládaná délka života je až 18 let.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

gronska@zoo-olomouc.cz

+420 608 101 325